

## Kapitel 3

Några uppgifter ur kapitel 3, Geometri.

3122. Låt oss kalla vinklarna  $\alpha$  och  $\beta$ .

$$\begin{cases} v + \alpha + \beta = 180 \\ u + 2\alpha + 2\beta = 180 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = 180 - v \\ u + 2(\alpha + \beta) = 180 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = 180 - v \\ u + 2(180 - v) = 180 \end{cases} \Rightarrow$$
$$u + 2(180 - v) = 180 \Rightarrow u = 2v - 180^\circ$$

3142. Låt kvadratens sida vara  $= 1$ , då blir de tre vita triangeln:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1+2+2}{8} = \frac{5}{8} \Rightarrow \text{färgad del} = \frac{3}{8}$$

3328. a)

$$\frac{12}{5} = \frac{a}{2} \Rightarrow a = \frac{24}{5} = 4.8$$

b) T.ex.  $2 \cdot (5, 2) = (10, 4)$

3407.

$$\cos 63^\circ = \frac{85}{F_{tot}} \Rightarrow F_{tot} = \frac{85}{\cos 63^\circ} \approx 187 \approx 190 \text{ N och } \frac{F}{85} = \tan 63^\circ \Rightarrow F \approx 166 \approx 170 \text{ N}$$

3408. a)  $\sqrt{850^2 + 180^2} \approx 870 \text{ km/h}$

b)

$$\tan \alpha = \frac{180}{850} \Rightarrow \alpha \approx 12^\circ \text{ östlig kurs}$$

3408.

$$(13 \cdot \cos 55^\circ + 28 \cdot \cos 35^\circ, 13 \cdot \sin 55^\circ - 28 \cdot \sin 35^\circ) = (30, -5.4)$$

$$|F| = 30 \text{ N och riktning } -10^\circ$$

## Test 3

1.

$$x + y = 180 \text{ men } x = 2y \Rightarrow 2y + y = 3y = 180 \Rightarrow y = 60^\circ$$

2. Ur figuren fås direkt:

$$\sin 25^\circ = \frac{2.1}{5} \approx 0.42$$

(Figurens mått 4.8 cm är fel, borde vara 4.5 cm (om de andra är riktiga).)

3. Om vi tänker oss tre strålar från punkten  $P$  ut till triangelns hörn ses att vridningen för överlapp blir  $120^\circ$ .

4. Man ser direkt att:

$$\sin \nu = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \Rightarrow \nu = 30^\circ$$

5. Sfärens radie är  $r$  dvs:

$$\frac{\text{sfärens volym}}{\text{kubens volym}} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{(2r)^3} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{8r^3} = \frac{4}{3}\pi \frac{1}{8} = \frac{\pi}{6} \text{ VSV}$$

6. Triangel är rätvinklig, detta leder till att:

$$2y + 2x = 90 \Rightarrow x + y = 45 \Rightarrow y = 45 - x$$

7. Använd Pythagoras sats.

$$10^2 = 6^2 + x^2 \Rightarrow x^2 = 10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64 \Rightarrow x = 8 \text{ cm}$$

8. I formelsamlingen finns definitionerna av de trigonometriska funktionerna:

|                           |                            |                           |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| $\sin \nu = \frac{5}{13}$ | $\cos \nu = \frac{12}{13}$ | $\tan \nu = \frac{5}{12}$ |
| $\sin u = \frac{12}{13}$  | $\cos u = \frac{5}{13}$    | $\tan u = \frac{12}{5}$   |

9. Pythagoras sats:

$$\text{kabel}^2 = \left(\frac{490}{2}\right)^2 + (197 - 57)^2 \Rightarrow \text{kabel} \approx 280 \text{ m}$$

10. a)

$$\frac{x}{45} = \sin 37^\circ \Rightarrow x = 45 \cdot \sin 37^\circ \approx 27 \text{ cm}$$

b)

$$\frac{69}{x} = \sin 61^\circ \Rightarrow x = \frac{69}{\sin 61^\circ} \approx 79 \text{ dm}$$

(Fel i facilit.)

12. a)

$$\nu = \arctan \frac{18}{24} \approx 37^\circ$$

b)

$$\nu = \arcsin \frac{61}{92} \approx 42^\circ$$

14. a)  $\bar{u}_1 + \bar{u}_2 = (2, 4) + (-2, 3) = (0, 7)$

b)  $|\bar{u}_1 + \bar{u}_2| = |(0, 7)| = \sqrt{0^2 + 7^2} = 7$  l.e.

c)  $2\bar{u}_1 + 3\bar{u}_2 = 2 \cdot (2, 4) + 3 \cdot (-2, 3) = (4, 8) + (-6, 9) = (-2, 17)$

d)  $3\bar{u}_1 - 4\bar{u}_2 = 3 \cdot (2, 4) - 4 \cdot (-2, 3) = (6, 12) + (8, -12) = (14, 0)$

15. Vinkelns blir  $\arctan \frac{2}{10} \approx 11^\circ$  under horisontalplanet. Längden på vektorn blir  $\sqrt{10^2 + 2^2} \approx 10.2$  m/s.

## Blandade uppgifter i kapitel 3

1. De trigonometriska funktionernas definition (i formelsamlingen) ger direkt:

a)  $\sin x = \frac{4}{5}$

b)  $\cos y = \frac{4}{5}$

c)  $\tan y = \frac{3}{4}$

d)  $\sin y = \frac{3}{5}$

2. a)

$$\sin 32^\circ = \frac{x}{32} \Rightarrow x = 32 \sin 32^\circ \approx 17 \text{ cm}$$

b)

$$\sin 65^\circ = \frac{46}{x} \Rightarrow x = \frac{46}{\sin 65^\circ} \approx 51 \text{ dm}$$

6.

$$V = \frac{Bh}{3} = \frac{\pi r^2 \cdot 6.5}{3} = \frac{\pi (7.5^2 - 6.6^2) \cdot 6.5}{3} \approx 95 \text{ cm}^3$$

7.

$$\nu_2 = 145^\circ \Rightarrow \nu_1 = 180^\circ - 145^\circ = 35^\circ$$

9.  $\nu + 55^\circ + (180^\circ - 135^\circ) = 180 \Rightarrow \nu = 135^\circ - 55^\circ = 80^\circ$

10.

$$\tan 25^\circ = \frac{h}{145} \Rightarrow h = 145 \cdot \tan 25^\circ \approx 68 \text{ m}$$

11. Avståndet fås med hjälp av Pythagoras sats:

$$d = \sqrt{4.8^2 - 4.2^2} \approx 2.3 \text{ m}$$

12. Låt vinkelns  $B = x$  och  $A = 2x$ , då gäller:

$$15^\circ + x + 2x = 180 \Rightarrow 3x = 165^\circ \Rightarrow x = 55^\circ \text{ dvs } A = 110^\circ$$

13.

$$A = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{24 \cdot \sqrt{25^2 - 24^2}}{2} = 84 \text{ cm}^2$$

14.

$$A = \frac{b \cdot h}{2} \Rightarrow 1.35 = \frac{b \cdot 0.7b}{2} \Rightarrow b^2 = \frac{2.7}{0.7} \Rightarrow b \approx 2.0 \text{ m}, h \approx 1.4 \text{ m}$$

16.

$$A_r = \pi \cdot r^2, A_{2r} = \pi \cdot (2r)^2 = \pi \cdot 4r^2 = 4 \cdot A_r \text{ VSV}$$

21.

$$\nu + \nu + (180 - u) = 180 \Rightarrow 2\nu - u + 180 = 180 \Rightarrow u = 2\nu \text{ VSV}$$

22.

$$A_{\text{grön}} = \pi(18^2 - 13^2) = 155\pi \approx 490 \text{ mm}^2 = 4.9 \text{ cm}^2$$

23. a)

$$\angle ACH = \arccos \frac{26}{30} \approx 30^\circ$$

b)

$$AH = \sqrt{30^2 - 26^2}, BAC = \nu_1 + \nu_2 \approx 60^\circ + \arctan \frac{13}{\sqrt{30^2 - 26^2}} \approx 60^\circ + 41^\circ = 101^\circ$$

24. Låt den lilla cirkelns radie vara 1.

$$A_{\text{röd}} = \frac{\pi(2r)^2 - \pi r^2}{\pi(2r)^2} = \frac{\pi 4r^2 - \pi r^2}{\pi 4r^2} = \frac{\pi 3r^2}{\pi 4r^2} = \frac{3}{4}$$

25. Låt basen vara 12 cm, då hittas de två lika vinklarna som:

$$\nu_1 = \nu_2 = \arccos \frac{6}{18} \approx 70.5^\circ \text{ och toppvinkeln} = 38.9^\circ$$

26. Låt sidan var 4 längdenheter, då blir det blå området:

$$\frac{3 \cdot 3}{2} - \frac{2 \cdot 2}{2} = \frac{9 - 4}{2} = \frac{5}{2} \text{ a. e.}$$

$$\text{Hela triangelns area} = \frac{4 \cdot 4}{2} = 8 \Rightarrow \frac{\text{blå}}{\text{hela}} = \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{8} = \frac{5}{16}$$

27.

$$\bar{u} \parallel \bar{v} \text{ och } \bar{u} = 3\bar{v}$$

$$|\bar{u} + \bar{v}| = |3\bar{v} + \bar{v}| = |4\bar{v}| = 4|\bar{v}|$$

$$|\bar{u} - \bar{v}| = |3\bar{v} - \bar{v}| = |2\bar{v}| = 2|\bar{v}|$$

28.

$$\overline{CM} = -\bar{v}, \overline{AC} = \bar{u} + \bar{v}, \overline{AB} = \bar{u} - \bar{v}, \overline{BA} = \bar{v} - \bar{u}$$

29. Koordinaterna hos den resulterande vektorn blir:

$$(10 \cos 50^\circ + 31 \cos 40^\circ, 10 \sin 50^\circ - 31 \sin 40^\circ) \approx (30, -12)$$

Absolutbelopp  $\approx 33$  N och riktning  $\arctan \frac{-12}{30} \approx -22^\circ$ .

30.

|            | $\sin v$             | $\cos v$             | $\tan v$             |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| $30^\circ$ | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{1}{\sqrt{3}}$ |
| $45^\circ$ | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | $1$                  |
| $60^\circ$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | $\sqrt{3}$           |

32. Halva resultanten kan finnas som  $25 \cdot \cos 20^\circ$  dvs  $F_r = 2 \cdot 25 \cos 20^\circ \approx 47$  N

33. Stjärnans armars längd kan tecknas som  $2r \cdot \sin 72^\circ$  och det skall vara 5 armar, och ringen runt om är  $2 \cdot \pi \cdot r$  dvs  $2\pi r + 5 \cdot 2r \cdot \sin 72^\circ = 100$  mm  $\Rightarrow r \approx 6$  mm


34. Alla trianglar i figuren är kongruenta. Den stora triangelns hypotenusan = 5.

Om vi kallar kvadratens sida för  $x$  och adderar de delar som tillsammans utgör hypotenusan 5 fås:

$$x + x \frac{3}{4} + x \frac{4}{3} = 5 \Rightarrow x \left(1 + \frac{3}{4} + \frac{4}{3}\right) = 5 \Rightarrow x \frac{12 + 9 + 16}{12} = x \frac{37}{12} = 5 \Rightarrow$$

$$x = \frac{60}{37} \approx 1.6 \text{ cm}$$

35. Låt de små cirklarna har radie =  $r$  och den stora radie =  $2r$ .



Man kan hitta att den vänstra halvan av den gröna ytan är:

$$\frac{\pi r^2}{4} - \frac{r^2}{2} \Rightarrow A_{\text{grön}} = \frac{\pi r^2}{2} - r^2$$

Den högra halvan av den röda ytan kan skrivas som:

$$\frac{\pi(2r)^2}{8} - \frac{\pi r^2}{4} - \frac{r^2}{2} = \frac{\pi 4r^2}{8} - \frac{\pi r^2}{4} - \frac{r^2}{2} = \frac{\pi 2r^2}{4} - \frac{\pi r^2}{4} - \frac{r^2}{2} = \frac{\pi r^2}{4} - \frac{r^2}{2} \Rightarrow$$
$$A_{\text{röd}} = \frac{\pi r^2}{2} - r^2 \text{ VSV}$$